FONCTION EXPONENTIELLE

1-FONCTION EXPONENTIELLE NEPERIENNE

1-1-DEFINITION

La fonction réciproque de la fonction $\ln$ est appelée fonction exponentielle népérienne, on la note $\exp$, elle est définie par : $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in]0, +\infty[) \ln y = x \Leftrightarrow y = e^x = \exp(x)$

1-2-RESULTAT

- i- $(\forall x \in \mathbb{R}) e^x > 0$
- ii- $\exp(1) = e^1 = e$ et $\exp(0) = e^0 = 1$
- iii- $(\forall x \in]0, +\infty[) e^{\ln x} = x$ et $(\forall x \in \mathbb{R}) \ln(e^x) = x$
- iv- la fonction $\exp$ est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- v- $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ et $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$

1-3-PROPRIETE

Soient x, y et r des nombres réels, on a :

- i- $e^x \times e^y = e^{x+y}$ et $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- ii- $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ et $e^{rx} = (e^x)^r$

1-4-EXERCICE

1- résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

i- $e^{x^2+2x-3} = 1$; $e^{2x+1} = \frac{1}{e^x}$; $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}} = e$; $e^x + e^{-x} = 2$

ii- $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$

2- résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes

i- $e^{1-x} \leq e^{3x}$; $1 - e^{-x} < 0$; $\frac{2e^x - 3}{e^x - 2} < 0$

ii- $e^{2x} - 5e^x + 6 > 0$

SOLUTION

1- $e^{x^2+2x-3} = 1 \Leftrightarrow e^{x^2+2x-3} = e^0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

On a $\Delta = 16$ et $(x = 1$ ou $x = -3)$ donc $S = \{1, -3\}$

2- $e^{2x+1} = \frac{1}{e^x} \Leftrightarrow e^{2x+1} = e^{-x} \Leftrightarrow 2x + 1 = -x \Leftrightarrow x = \frac{-1}{3} \Leftrightarrow S = \left\{ \frac{-1}{3} \right\}$

3- $\frac{e^{2x+1}}{e^{x-3}} = e \Leftrightarrow e^{2x+1-(x-3)} = e \Leftrightarrow 2x + 1 - x + 3 = 1 \Leftrightarrow x = -3 \Leftrightarrow S = \{-3\}$

4- $e^x + e^{-x} = 2 \Leftrightarrow e^x + \frac{1}{e^x} = 2 \Leftrightarrow (e^x)^2 + 1 = 2e^x \Leftrightarrow (e^x - 1)^2 = 0$

Donc $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0 \Leftrightarrow S = \{0\}$

5- $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$; on pose $X = e^x$; l'équation s'écrit sous forme $2X^2 - 5X + 2 = 0$

On a $\Delta = 9$ et $(X = 2$ ou $X = \frac{1}{2})$ donc

$(e^x = 2$ ou $e^x = \frac{1}{2}) \Leftrightarrow (x = \ln 2$ ou $x = -\ln 2)$ d'où $S = \{\ln 2, -\ln 2\}$

FONCTION EXPONENTIELLE

6- $e^{1-x} \leq e^{3x} \Leftrightarrow 1-x \leq 3x \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{4} \Leftrightarrow S = \left[\frac{1}{4}, +\infty \right[$

7- $1 - e^{-x} < 0 \Leftrightarrow 1 < e^{-x} \Leftrightarrow e^0 < e^{-x} \Leftrightarrow 0 < -x \Leftrightarrow x < 0 \Leftrightarrow S =]-\infty, 0[$

8- on a $\frac{2e^x - 3}{e^x - 2} < 0$, on commence par $2e^x - 3 = 0 \Leftrightarrow e^x = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{3}{2}\right)$, et on a

aussi $e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \ln 2$, on étudie le signe de $2e^x - 3$ et $e^x - 2$

x	-∞	$\ln\left(\frac{3}{2}\right)$	$\ln(2)$	+∞
$2e^x - 3$	-	0	+	+
$e^x - 2$	-	-	0	+
$\frac{2e^x - 3}{e^x - 2}$	+	0	-	+

Donc $S = \left] \ln\left(\frac{3}{2}\right), \ln(2) \right[$

9- on a $e^{2x} - 5e^x + 6 > 0$, posons $X = e^x$, l'inéquation devient $X^2 - 5X + 6 > 0$

Les solutions de l'équation $X^2 - 5X + 6 = 0$ sont $X = 2$ ou $X = 3$. on a donc

$(e^x = 2 \text{ ou } e^x = 3) \Leftrightarrow (x = \ln 2 \text{ ou } x = \ln 3)$

x	-∞	$\ln 2$	$\ln 3$	+∞
$X = e^x$	0	2	3	+∞
$X^2 - 5X + 6$	+	0	-	0
$e^{2x} - 5e^x + 6$	+	0	-	0

Donc la solution de l'inéquation est: $S =]-\infty, \ln 2[\cup]\ln 3, +\infty[$

2-LIMITES PARTICULIERES

2-1-PROPRIETE

i- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

ii- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$

iii- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

2-2-EXERCICE

calculer les limites suivantes :

i- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{x}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x$

ii- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x^2}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{2x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x - 1}{e^x + 1}$

SOLUTION

FONCTION EXPONENTIELLE

$$1- \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = \frac{0}{-\infty} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{e^x}{x}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$2- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \times (e^x)^2 = (+\infty)(+\infty) = +\infty$$

$$3- \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x - e^x = 0 - 0 = 0$$

$$4- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{x^2} = (+\infty) - 0 = +\infty$$

$$5- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x - 1}{e^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x \left(2 - \frac{1}{e^x} \right)}{e^x \left(1 + \frac{1}{e^x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{e^x}}{1 + \frac{1}{e^x}} = \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2$$

$$6- \text{posons } X = -x \text{ ; on a } \lim_{x \rightarrow 0} X = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{e^X - 1}{-X} = - \lim_{X \rightarrow 0} \frac{e^X - 1}{X} = -1$$

$$7- \text{posons } X = 3x \text{ ; on a } \lim_{x \rightarrow 0} X = \lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{2x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{e^X - 1}{2 \frac{X}{3}} = \frac{3}{2} \lim_{X \rightarrow 0} \frac{e^X - 1}{X} = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$$

3-DERIVEE D'UNE FONCTION EXPONENTIELLE

3-1- PROPRIETE

i- la fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$; et on a $(\forall x \in \mathbb{R}) (e^x)' = e^x$

ii- si la fonction u est dérivable sur $I \subset \mathbb{R}$ alors la fonction $x \rightarrow e^{u(x)}$ est dérivable sur I, et sa dérivée est : $(\forall x \in I) (e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$

3-2-EXEMPLE

Etudions la fonction $f(x) = e^x$

$$1- D_f = \mathbb{R}$$

$$2- \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$3- (\forall x \in \mathbb{R}) \quad f'(x) = (e^x)' = e^x > 0$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$+\infty$

4- représentation graphique

FONCTION EXPONENTIELLE

3-3-EXERCICE

1- calculer la dérivée de la fonction f dans les cas suivants :

$$f(x) = 2x - e^x ; f(x) = xe^{x^2-1} ; f(x) = (x-1)e^{-\frac{1}{x}}$$

2- soit $f(x) = 2e^{2x} - 3e^x + 1$

a- déterminer le domaine de définition de f, et calculer les limites aux bornes de D_f

b-étudier les variations de f

c-déterminer les points d'intersections de l'axe des abscisses et la courbe C_f

d- déterminer l'équation de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 0

e- étudier les branches infinies

f-tracer la courbe C_f

4-FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE a

4-1-DEFINITION

soit a un réel strictement positif et différent de 1, la fonction exponentielle de base a, qui se note $\exp_a$ et définie par : $\exp_a(x) = a^x$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad \exp_a(x) = a^x = e^{x \ln a}$$

4-2-PROPRIETE

i- $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) \quad a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$

ii- $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) \quad a^x a^y = a^{x+y} ; \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} ; \quad (a^x)^y = a^{xy}$

iii - si $0 < a < 1$ alors $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad a^x < a^y \Leftrightarrow x > y$

iv - si $a > 1$ alors $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad a^x < a^y \Leftrightarrow x < y$

4-3-EXERCICE

1- résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$2^x = 3; \quad 16^x - 5 \times 4^x + 6 = 0$$

2- résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

FONCTION EXPONENTIELLE

$$5^x < 10; \quad 9^x > 3^{-x+1}; \quad 4^x - 3 \times 2^x + 2 \geq 0$$

4-4-FONCTION EXPONENTIELLE A BASE 10

DEFINITION

la fonction $x \rightarrow 10^x$ est appelée fonction exponentielle à base 10, et on a
 $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in]0, +\infty[) \quad 10^x = y \Leftrightarrow x = \log y$

FUNCTION EXPONENTIELLE

EXERCICE 1

Soit $g(x) = e^{2x} - 2x - 1$

1-étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$

2-déduire le signe de g(x) sur $\mathbb{R}$

3-soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x + 1)e^{-2x} + x + 1$$

a- calculer les limites de f au voisinage de $\pm\infty$

b-étudier les branches infinies de C_f

c- montrer que $f'(x) = g(x)e^{-2x}$

d-donner TV

e- étudier la concavité de C_f

f-tracer C_f

EXERCICE 2

1-Soit $g(x) = 1 + (x - 1)e^x$

a- déterminer D_g et calculer les limites en $\pm\infty$

b-étudier les variations de g et déduire le signe de g

2-Soit $f(x) = (x - 2)(e^x + 1)$

a- calculer les limites en $\pm\infty$

b- étudier les branches infinies de C_f

c-étudier les variations de f

d-étudier la concavité de C_f

e- étudier les positions relatives de C_f et la droite d'équation $y = x - 2$ et tracer C_f

EXERCICE 3

$$\text{Soit } f(x) = x - \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$$

1- déterminer D_f et étudier la parité de f

2-calculer les limites en $\pm\infty$

3-calculer les limites à droite et à gauche de f en 0

4-a- vérifier que :

$$(\forall x \in D_f) \quad f(x) = x - 1 - \frac{2e^{-x}}{1 - e^{-x}}$$

b- déduire que $y = x - 1$ est une asymptote oblique à C_f au voisinage de $+\infty$

5-a-étudier les variations de f

a- montrer que $f(x)=0$ admet une solution dans $]\ln 2, \ln 5[$

6- étudier la concavité de C_f , tracer C_f

EXERCICE 4

Soit f une fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1}, & x > 0 \\ f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}, & x \leq 0 \end{cases}$$

1-a- étudier la continuité de f au point 0

b- calculer les limites de f au $+\infty$ et $-\infty$

c- étudier les branches infinies de (C_f)

d- étudier la position relative de f et la droite $y = 2x - 1$ au voisinage de $+\infty$

2- étudier la dérivabilité de f à gauche au point 0, et déduire la demi-tangente de (C_f) au point 0

3-a- calculer $f'(x)$, puis donner le tableau de variation de f

b-tracer (C_f)

EXERCICE 5

Soit f une fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = e^{\frac{2}{x}}, & x < 0 \\ f(x) = x \ln(1 + x^2), & x \geq 0 \end{cases}$$

1-a- étudier la continuité de f au point 0

b- calculer les limites de f au $+\infty$ et $-\infty$

c- étudier les branches infinies de (C_f)

2- étudier la dérivabilité de f au point 0, et déduire la tangente de (C_f) au point 0

3-a- calculer $f'(x)$, puis donner le tableau de variation de f

b- montrer que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion au point (-1), et donner l'équation de la tangente de (C_f) au point (-1)

c-tracer (C_f)